

## Niva Fryšávky

### Popis:

V nivě říčky Fryšávky a jejího přítoku - Bílého potoka, u obce Kuklík v CHKO Žďárské vrchy se zachovala pro tuto oblast typická vegetace vlhkých pcháčových luk i rašelinných luk. Na jednu z rostlin - krvavec toten (*Sanguisorba officinalis*) je vázán životní cyklus motýla modráška bahenního (*Phengaris nausithous*), který se zde nachází v početné populaci. Spolu s ním zde žijí i další druhy vzácných a ohrožených rostlin a živočichů.

### Podrobný popis:

Jedna z lokalit soustavy chráněných území Natura 2000 nacházející se v plochém údolí Bílého potoka a v nivě Fryšávky jižně od obce Kuklík na Novoměstsku. Geologickým podkladem jsou krystalické břidlice, zejména ruly, svory, migmatity a jejich zvětraliny, v nivě jsou překryté říčními usazeninami. Nejčastějšími půdními typy zde jsou podél potoků gleje, časté jsou pseudogleje a na svazích kyselá kambizemě. Vodní toky lemují liniové porosty olší lepkavých (*Alnus glutinosa*) a olší šedých (*A. incana*), v podrostu místy s chřásticí rákosovitou (*Phalaris arundinacea*) a tužebníkem jilmovým (*Filipendula ulmaria*). Většina luk v nivě má charakter vlhkých pcháčových luk, na kterých můžeme najít pcháč bahenní (*Cirsium palustre*), pcháč potoční (*C. rivulare*) a p. různolistý (*C. heterophyllum*), blatouch bahenní (*Caltha palustris*), rdesno hadí kořen (*Bistorta major*) či sítinu rozkladitou (*Juncus effusus*). Jejich značná část již však má charakter tužebníkových lad, u kterých v důsledku dlouhodobého nekosení převládá tužebník jilmový či skřípina lesní (*Scirpus sylvaticus*). Sušší louky na svazích mají už více intenzivnější charakter a svým složením se blíží ovsíkovým loukám, kde je z kvetoucích rostlin běžná kopretina irkutská (*Leucanthemum ircutianum*). Místy, například na mezích, zůstaly zachovány zbytky podhorských smilkových trávníků s hvozdíkem kropenatým (*Dianthus deltoides*), zvonkem okrouhlostým (*Campanula rotundifolia*) či pupavou bezlodyžnou (*Carlina acaulis*). Na jednom prameništi se zachovala vegetace rašelinné louky s výskytem zábělníku bahenního (*Comarum palustre*) a suchopýru úzkolistého (*Eriophorum angustifolium*). Častou rostlinou pcháčových luk je i krvavec toten (*Sanguisorba officinalis*). Ten je živnou rostlinou housenek motýla modráška bahenního (*Phengaris nausithous*), díky němuž je celé území zařazeno do soustavy Natura 2000. Ze živočišné říše se zde dále vyskytují zmije obecná (*Vipera berus*), užovka obojková (*Natrix natrix*), slepýš křehký (*Anguis fragilis*), chřástal polní (*Crex crex*), ůuhák obecný (*Lanius collurio*), skorec vodní (*Cinclus cinclus*) či ledňáček říční (*Alcedo atthis*).

Region: Novoměstsko a Žďársko

Město: Kuklík

### URL:

[http://www.nature.cz/natura2000-design3/web\\_lokality.php?cast=1805&akce=karta&id=1000122259](http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_lokality.php?cast=1805&akce=karta&id=1000122259)

Zpřístupnění: volně přístupné

Bezbariérový přístup: ano s omezením

GPS: 49°37'13"N, 16°6'56"E

Mapa: <http://maps.google.com/maps?q=49.6202778,16.1155556&z=12>

Obrázky:

