

Na Skaličce

Popis:

Bývalá pastvina s roztroušenými jalovci na členitých svazích hluboce zaříznutého údolí Leštinského potoka před jeho ústím do řeky Jihlavy u Číchova představuje významný krajinný prvek v regionu. Hostí některé chráněné a regionálně významné druhy rostlin a organismů, z nichž nejvýznamnější je populace hořečku nahořklého (*Gentianella amarella*).

Podrobný popis:

Bývalá svažité pastvina hostí komplex suchomilných trávníků společenstev bylinných lemů a mezofilních křovin. Horninové podloží tvoří mramory a skarny uložené v rulách moravského moldanubika. Na lokalitě se nachází i malý opuštěný lom. Povrch pokrývá kambizem, místy se vyvinul glej a na odvalech v lomu leží antropogenní půdy. Vegetaci tvoří pestrá mozaika suchomilných trávníků mělkých půd, travinobylinných lemů a křovin. Přítomnost bazického podloží ovlivňuje tato společenstva směrem k širokolistým suchým trávníkům, na místech mimo bazické podloží však nacházíme i náznaky přechodů k acidofilním suchým trávníkům. Malá, ale regionálně důležitá, je populace hořečku nahořklého (*Gentianella amarella*), vyskytujícího se na Třebíčsku pouze na dvou místech. K významnějším rostlinným druhům patří např. řepík lékařský (*Agrimonia eupatoria*), rmen barvířský (*Anthemis tinctoria*), pamětník rolní (*Acinos arvensis*), huseník chlupatý (*Arabis hirsuta*), pupava obecná (*Carlina vulgaris*) či chrpa čekánek (*Centaurea scabiosa*). V minulosti byla uváděna i záraza vyšší (*Orobancha elatior*), parazitující na čekánku. Dále se zde vyskytují bedrník obecný (*Pimpinella saxifraga*), čičorka pestrá (*Coronilla varia*), hvozdík kropenatý (*Dianthus deltoides*), kostřava ovčí (*Festuca ovina*) a mnohé jiné druhy. Roztroušeně zde roste i jalovec obecný (*Juniperus communis*). V podrostu lískových křovin můžeme spatřit hajní druhy jako kopytník evropský (*Asarum europaea*), jaterník podléšku (*Hepatica nobilis*) či pro nižší polohy jižní část Českomoravské vrchoviny typický brambořík nachový (*Cyclamen purpurascens*).

Celé údolí obývají druhově pestrá společenstva hmyzu. V početné populaci zde žije např. hnědásek květelový (*Melitaea didyma*), dále např. okáč kostřavový (*Arethusana arethusana*), ostruháček kapiniový (*Satyrium acaciae*), žlutokřídlec janovcový (*Rhodostrophia vibicaria*), můry *Eucarta virgo* a *Eriopygodes imbecillus* nebo faunisticky významný štětconoš smrkový (*Calliteara abietis*).

I na této lokalitě došlo po ukončení tradičního obhospodařování, kterým byla pastva, k postupnému zarůstání a ustupování cenných druhů. V současnosti probíhají snahy o udržení populace hořečku nahořklého spočívající zejména v kosení cenných partií a vyřezávání náletových dřevin.

Region: Třebíčsko

Město: Číchov

URL: http://drusop.nature.cz/ost/chrobjedy/zchru/index.php?frame&SHOW_ONE=1&ID=1414

Zpřístupnění: volně přístupné

Bezbariérový přístup: nedefinováno

GPS: 49°17'13.469"N, 15°45'59.767"E

Mapa: <http://maps.google.com/maps?q=49.2870747,15.7666019&z=12>

Obrázky:

