

Suchá hora

Popis:

Přírodní rezervaci Suchá hora tvoří smíšené listnaté porosty na stanovištích bohatých a vysýchavých dubových bučin rostoucích na jižních a východních svazích vrchu Suchá hora asi 2,5 km jihovýchodně od Dešova nedaleko Vranovské přehrady v nadmořské výšce 510 až 571 m. Výskyt řady vzácných a zajímavých rostlinných druhů, např. bramboříku nachového.

Podrobný popis:

Geologické podloží je tvořeno rulami a migmatity s vložkami amfibolitů, 0,5 km západně od lokality je mramorový lom. Z části se zde vyskytují i světlé ruly gfóhlského typu. Půdní pokryv tvoří kambizem typická, na sprašových pokryvech fluvizem typická.

Území tvoří kupovitý povrch holoroviny Dešovské pahorkatiny se dvěma vrcholy oddělené sedlem. Východní svahy pokrývají nesouvisle vyvinuté sprašové hlíny, jinak jsou zde vytvořeny kambizemě.

V západní části rezervace dominuje buk lesní (*Fagus sylvatica*) s příměsí habru (*Carpinus betulus*), lípy malolisté (*Tilia cordata*) a javoru klenu (*Acer pseudoplatanus*). Východní a jižní část mají již více charakter dubohabřin. Pod hlavní úrovní tvořené dubem zimním (*Quercus petraee*) je druhově bohaté nižší stromové patro tvořené habrem obecným (*Carpinus betulus*) s lípou malolistou (*Tilia cordata*), javorem mléčem (*Acer platanoides*) a jilmem vazem (*Ulmus laevis*). Rostou zde typické hajní druhy, z nichž uvádíme atraktivní brambořík nachový (*Cyclamen purpurascens*), dymnivku plnou (*Corydalis solida*) a d. dutou (*C. cava*), nezelenou orchidej hlízník hnízdák (*Neottia nidus-avis*), kopytník evropský (*Asarum europaeum*), kostřavu lesní (*Festuca altissima*), sveřep Benekenův (*Bromus benekenii*), křivatec žlutý (*Gagea lutea*), kyčelnici cibulkonosnou (*Dentaria bulbifera*), lýkovec jedovatý (*Daphne mezereum*), a žlutě kvetoucí sasanku pryskyřníkovitou (*Anemonoides ranunculoides*). S vegetací potočních olšin a pramenišť se můžeme setkat kolem pramenů Bítovského potoka a na dně potočního údolí při V okraji území. Rostou zde prvosenka vyšší (*Primula elatior*), ocún jesenný (*Colchicum autumnale*), kozlík dvoudomý (*Valeriana dioica*), lilek potměchuť (*Solanum dulcamara*), orsej jarní (*Ficaria bulbifera*) či ostřice trsnatá (*Carex cespitosa*). Nápadný je i bohatý porost česneku medvědího (*Allium ursinum*).

Region: Moravskobudějovicko a Jemnicko

Město: Dešov

URL: http://drusop.nature.cz/ost/chrobjety/zchru/index.php?frame&SHOW_ONE=1&ID=1819

Zpřístupnění: volně přístupné

Bezbariérový přístup: ano s omezením

GPS: 48°58'1.296"N, 15°43'11.548"E

Mapa: <http://maps.google.com/maps?q=48.9670267,15.7198744&z=12>

Obrázky:

