

## Kobylinec

### Popis:

Menší travnatý pahorek (450 m n. m.), který by v minulosti využívan jako pastvina. Lokalita s výskytem chráněného koniklece velkokvětého i jiných vzácných druhů je písčítokamenitou cestou rozdělena na dvě nestejně velké části s obnaženými skalisty, písčitou půdou.

Lokalita je zároveň chráněna jako evropsky významná lokalita (součást celoevropské soustavy chráněných území Natura 2000).

### Podrobný popis:

Podloží tvoří hornina třebíčského masivu durbachit neboli též třebíčský syenit, na kterém je vyvinuta zejména kambizem, kolem skalních výchozů jsou časté tzv. primitivní půdy. Z geomorfologického hlediska se jedná o exfoliační klenby (ruwary) na holorovině.

Lokalita je známá především jako bohaté naleziště v časném jaru kvetoucího koniklece velkokvětého (*Pulsatilla grandis*), který roste zejména ve vegetaci xerothermních acidofilních trávníků. Jeho současná populace kolísá v rozmetí 3000 - 8000 kvetoucích trsů. Vedle koniklece jsou zjara nápadné také porosty mochny jarní (*Potentilla tabernaemontani*). Během léta lze na lokalitě pozorovat řadu dalších druhů v čele s jetelem alpínským (*Trifolium alpestre*), jestřábníkem chlupáčkem (*Hieracium*

*pilosella*), kručinkou barvířskou (*Genista tinctoria*) a silenkou nicí (*Silene nutans*). Z trav dominuje kostřava ovčí (*Festuca ovina*), častý je také psineček tuhý (*Agrostis vinealis*), bojínek tuhý (*Phleum phleoides*), bělolist rolní (*Filago arvensis*) a smělek štíhlý (*Koeleria macrantha*). Z významných druhů zde má početnější populaci silně ohrožený smil písečný (*Helichrysum arenarium*) rostoucí na místech s nezapojenou vegetací u skalních výchozů, dále zde roste rozrazil rozprostřený (*Veronica prostrata*), sesel sivý a roční (*Seseli osseum* a *S. annuum*), lomikámen cibulkatý (*Saxifraga bulbifera*), velmi vzácně kociánek dvoudomý (*Antennaria dioica*) a višěň křovitá (*Prunus fruticosa*).

Po zoologické stránce jsou prozkoumané především skupiny blanokřídlého hmyzu a ploštic. Zaznamenán byl např. výskyt silně ohroženého pačmeláka cizopasného (*Bombus rupestris*) i dalších 4 ohrožených čmeláků rodu *Bombus* sp. Z brouků byla zjištěna početnější populace svižníka polního (*Cicindela campestris*). Z plazů byl zjištěn roztroušený výskyt ještěrky obecné

(*Lacerta agilis*), ojedinele pak slepýš křehký (*Anguis fragilis*). Udáván je také výskyt užovky hladké (*Coronella*

*austriaca*). Ptáci jsou zastoupeni běžnějšími druhy, za zmínku stojí výskyt řuhýka obecného (*Lanius collurio*), v okolí lokality byla pozorována koroptev polní (*Perdix perdix*) a křepelka obecná (*Coturnix coturnix*).

Tradičním využitím takovýchto málo produktivních pozemků byla pastva zejména drobného zvířectva, často ovcí a koz. Po celkové změně života na vesnici po roce 1950 se od tohoto tradičního obhospodařování upustilo a postupně docházelo k šíření některých agresivních trav, zejména třtiny křovištní, a pomístnímu zarůstání křovinami. Takový osud postihnul i toto chráněné území, avšak před úplným zánikem lokalitu zřejmě zachránili první ochranné zásahy v r. 1990. Přibližně od r. 1995-1996 je lokalita pravidelně kosená a nálety dřevin jsou odstraňovány průběžně. Bohužel se zatím do území nepodařilo navrátit původní pastvu.

Územím prochází poměrně frekventovaná modře značená turistická trasa i cyklotrasa, zejména v době květu konikleců je lokalita hojně navštěvována turisty.

Region: Třebíčsko

Město: Trnava

URL: [http://drusop.nature.cz/ost/chrojekt/zchru/index.php?frame&SHOW\\_ONE=1&ID=873](http://drusop.nature.cz/ost/chrojekt/zchru/index.php?frame&SHOW_ONE=1&ID=873);  
[http://www.nature.cz/natura2000-design3/web\\_lokality.php?cast=1805&akce=karta&id=1000120518](http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_lokality.php?cast=1805&akce=karta&id=1000120518)

Zpřístupnění: volně přístupné

Bezbariérový přístup: nedefinováno

GPS: 49°15'0.342"N, 15°56'10.489"E

Mapa: <http://maps.google.com/maps?q=49.250095,15.9362469&z=12>

Obrázky:

