

## Babínský rybník

### Popis:

Fragmenty rašeliniště se stabilní populací vážky jasnoskvrnné (*Leucorrhinia pectoralis*). Jedna ze dvou lokalit tohoto druhu v CHKO Žďárské vrchy.

### Podrobný popis:

Krajinný komplex rybníků, jejich okrajů, rašelinišť a na ně navazujících lučních a lesních porostů.

Geologickým podložím jsou pararuly, které jsou překryty čtvrtohorními písčitojílovitými sedimenty a vrstvou rašeliny.

Území se nachází v pramenné oblasti řeky Oslavy s jezerními a říčními neogenními usazeninami, zbytky třetihorních zvětralin.

V okolí rybníka Babín se nacházejí fragmenty rašeliniště a mokřady v okolí drobných tůní.

Původní rašeliniště jsou z větší části vytěžena, typické vrchoviště je zachováno nad rybníkem Babín. V části po dřívější těžbě rašeliny došlo k zarůstání třtinou s dřevinnými nálety, především olše lepkavé.

Severně od rybníka Babín jsou zachována typická rašeliništní společenstva (přechodové rašeliniště) s výskytem rosnatky okrouhlolisté (*Drosera rotundifolia*), vachty trojlísté (*Menyanthes trifoliata*), vrbiny kytkokvěté (*Lysimachia thyrsoflora*) aj. Rašeliništní druhy postupně přirozeně znovu osidlují i plochy devastované těžbou rašeliny.

Z dalších význačných typů biotopů se na lokalitě vyskytují také rákosiny, porosty vysokých ostřic, okrajově i rašelinné, pcháčkové a smilkové louky. Při vypuštění rybníka Babín se objevují typické rostliny obnažených rybníčních den, části mokřadů jsou zarostlé bochánky vrb a náletovými dřevinami.

Z Matějovského rybníka pochází poslední dokladovaný výskyt sekavce písečného (*Cobitis taenia*) na Žďársku (z roku 1970). Bohatá je fauna obojživelníků, vyskytuje se zde čolek velký (*Triturus cristatus*), čolek horský (*Triturus alpestris*), čolek obecný (*Triturus vulgaris*). Hojný je výskyt ptáků. Hnízdí zde potápka roháč (*Podiceps cristatus*), potápka černokrká (*Podiceps nigricollis*), moták pochop (*Circus aeruginosus*), chřástal vodní (*Rallus aquaticus*), bekasina otavní (*Gallinago gallinago*) či vodouš kropenatý (*Tringa ochropus*) a vodouš rudonohý (*Tringa totanus*) aj.

Region: Novoměstsko a Žďársko Novoměstsko a Žďársko Novoměstsko a Žďársko

Město: Nové Veselí Matějov Budeč

URL: [http://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/evl/index.php?frame&SHOW\\_ONE=1&ID=11979](http://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/evl/index.php?frame&SHOW_ONE=1&ID=11979);  
[http://www.nature.cz/natura2000-design3/web\\_lokality.php?cast=1805&akce=karta&id=1000117898](http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_lokality.php?cast=1805&akce=karta&id=1000117898)

Zpřístupnění: nedefinováno

Bezbariérový přístup: nedefinováno

GPS: 49°32'32"N, 15°53'47"E

Mapa: <http://maps.google.com/maps?q=49.5422222,15.8963889&z=12>

Obrázky:

