

Rasuvěň

Popis:

Přírodě blízká jedlová bučina pralesovitého typu s typickým bylinným patrem a výskytem ohrožených a zvláště chráněných živočichů na vrcholu a SZ svahu kóty Bukovec SZ od Dolních Borů. Geomorfologický fenomén kamenného moře.

Podrobný popis:

Podloží lokality je tvořeno horninami moldanubika, migmatitickými biotitickými rulami s kyanitem. Vrchol je budován čočkou z tmavých granulitů, cordieritických rohovců a cordierit-biotitických pararul. Půda je tvořena varetou kyselé kambizemě s pseudoglejem. V terénu místy vystupují na povrch jednotlivé skalky, které přechází v kamenné moře. Vegetaci tvoří přírodě blízké lesní porosty s přítomností charakteristických druhů jedlobučin. Ve stromovém patře převládá buk lesní (*Fagus sylvatica*) s příměsí jedle bělokoré (*Abies alba*), smrku ztepilého (*Picea abies*), javoru klenu (*Acer pseudoplatanus*), javoru mléče (*Acer platanoides*) a lípy malolisté (*Tilia cordata*). V podrostu se vyskytují kapraď samec (*Dryopteris filix-mas*), česnáček lékařský (*Alliaria petiolata*), svízel vonný (*Galium odoratum*), hrachor jarní (*Lathyrus vernus*), lýkovec jedovatý (*Daphne mezereum*) a další. Z druhů vyšších poloh zde roste plavuň pučivá (*Lycopodium annotinum*). Staré doupné stromy jsou mimo jiné významné pro hnízdění dutinových ptáků, jako je holub doupňák (*Columba oenas*), sýc rousný (*Aegolius funereus*), žluna šedá (*Picus canus*), rehek zahradní (*Phoenicurus phoenicurus*) a další.

Region: Velkomeziříčsko a Bítešsko

Město: Bory

URL: http://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/zchru/index.php?frame&SHOW_ONE=1&ID=1448

Zpřístupnění: volně přístupné

Bezbariérový přístup: nedefinováno

GPS: 49°26'9.006"N, 15°59'29.927"E

Mapa: <http://maps.google.com/maps?q=49.435835,15.9916464&z=12>

Obrázky:

