

Kocoury

Popis:

Listnatý remíz a luční lada na SZ svahu kóty Vrchy s výskytem významných druhů rostlin a především populací zvláště chráněné sasanky lesní (*Anemone sylvestris*). Výskyt neobvyklé druhové pestrosti rostlinných druhů v malém remízku je podmíněn vložkou krystalického vápence.

Podrobný popis:

Podloží lokality tvoří biotitické ruly s vložkami krystalických vápenců, místy s tremolitem. Z půd zde vznikla rendzina i kambizem. Na kamenných snosech a vystupujících drobných skalkách jsou vytvořeny zapojené náletové porosty dřevin s převládajícím bukem lesním (*Fagus sylvatica*), lískou obecnou (*Corylus avellana*) a břízou bělokorou (*Betula pendula*). V jejich podrostu roste řada lesních a hájových druhů, např. samorostlík klasnatý (*Actaea spicata*), zvonek broskvolistý (*Campanula persicifolia*), lýkovec jedovatý (*Daphne mezereum*), zimolez pýřitý (*Lonicera xylosteum*), bažanka vytrvalá (*Mercurialis perennis*), kopytník evropský (*Asarum europaeum*), kokořík mnohokvětý (*Polygonatum multiflorum*) a violka Rivinova (*Viola riviniana*). V travinobylinných porostech se vyskytuje řada teplomilných a suchomilných druhů, např. vítod chocholatý (*Polygala comosa*), černýš hajní (*Melampyrum nemorosum*), jitrocel prostřední (*Plantago media*), klinopád obecný (*Clinopodium vulgare*), devaterník velkokvětý pravý (*Helianthemum grandiflorum* subsp. *obscurum*), krvavec menší (*Sanguisorba minor*), jetel horský (*Trifolium montanum*) a prvosenka jarní (*Primula veris*). Sasanka lesní (*Anemone sylvestris*) zde roste v relativně početné populaci a její výskyt v nadmořské výšce okolo 620 m je velmi pozoruhodný. Z dalších významných druhů zde roste na podzim modře kvetoucí hořeček brvitý (*Gentianopsis ciliata*) a či nenápadná orchidej bradáček vejčitý (*Listera ovata*). Místy se projevuje nežádoucí expanze především ovsíku vyvýšeného (*Arrhenatherum elatius*) a pcháče rolního (*Cirsium arvense*). Podrobný zoologický průzkum bohužel nebyl dosud proveden.

Vzhledem k podloží krystalického vápence a charakteru dnešního reliéfu lze předpokládat že na lokalitě v minulosti docházelo k drobné povrchové těžbě pro malovýrobu páleného vápna a těžbě kamene ke stavením účelům a na opravu cest. Zároveň byla lokalita a její blízké okolí využívána k pastvě skotu. Tento způsob využití lokality byl postupně ukončen v 50. letech 20. stol. a vedl k postupnému převládnutí dřevinných náletových porostů a také k expanzi ovsíku vyvýšeného. Od doby zřízení přírodní památky je zda zajišťována pravidelná péče spojená s kosením travních porostů a občasnou redukcí náletových dřevin.

Region: Bystřicko

Město: Prosetín

URL: http://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/zchru/index.php?frame&SHOW_ONE=1&ID=1856

Zpřístupnění: volně přístupné

Bezbariérový přístup: nedefinováno

GPS: 49°32'14.256"N, 16°24'1.780"E

Mapa: <http://maps.google.com/maps?q=49.5372933,16.4004944&z=12>

Obrázky:

