

## Čepičkův vrch a údolí Hodonínky

### Popis:

Typicky vyvinuté suťové lesní porosty a skalní výchozy na severovýchodním svahu vrchu Čepička, na jihozápadních a jižních svazích vrchů Páleniny a Podskálí a mezilehlé údolí potoka Hodonínky nedaleko Štěpánova nad Svratkou. Výskyt celé řady ohrožených druhů rostlin a živočichů. Území je součástí Přírodního parku Svratecká hornatina a leží jak v Jihomoravském kraji, tak v kraji Vysočina.

### Podrobný popis:

Lokalita hostí cenná společenstva suťových lesů v komplexu s květnatými bučinami. Horninový podklad tvoří metamorfované horniny proterozoika, především dvojslídne ruly, na východním okraji území vystřídáné rulami muskovitickými. Na severovýchodních svazích vrchu Čepička a místně i jinde se nacházejí deluviální hlinito-kamenité sedimenty s bloky hornin. Na mírnějších svazích se nacházejí typické kambizemě (nasyčená i kyselá), na sutích a v okolí skalních výchozů pak rankery a litozemě. Na relativně strmých svazích jsou vyvinuta společenstva suťových lesů v komplexu s květnatými bučinami. V údolí Hodonínky a na bázích svahů s pramennými vývěry jsou vyvinuty jasanové olšiny s maloplošnou vegetací lesních pramenišť, ve kterých ojediněle roste i bledule jarní (*Leucojum vernum*). Většina porostů se vyznačuje charakteristickým a většinou bohatým bylinným patrem. Pozoruhodný je fragmentární výskyt nízkých xerofilních křovin na skalách čepičky. Na řadě míst je vyvinuta štěrbinová vegetace silikátových skal a drovin. Druhově bohaté je stromové patro, vedle buku lesního (*Fagus sylvatica*) zde můžeme najít javor klen (*Acer pseudoplatanus*), j. mléč (*A. platanoides*), jasan ztepilý (*Fraxinus excelsior*), habr obecný (*Carpinus betulus*), lípu velkolistou (*Tilia platyphyllos*) a jilm horský (*Ulmus glabra*), dole v údolí rostou mohutné exempláře smrku ztepilého (*Picea abies*). V podrostu je místy hojná měsíčnice vytrvalá (*Lunaria rediviva*), svízel vonný (*Galium odoratum*), prvosenka vyšší (*Primula elatior*), kyčelnice cibulkonosná (*Dentaria bulbifera*) i vzácnější k. devítilistá (*D. enneaphyllos*), samorostlík klasnatý (*Actaea spicata*) či bažanka vytrvalá (*Mercurialis perennis*). Z kapradin se můžeme setkat s kapradí osténkatou (*Dryopteris carthusiana*), k. samcem (*D. filix-mas*), papratkou samičí (*Athyrium filix-femina*) a kapradinou laločnatou (*Polystichum aculeatum*). Na vystupujících skalách jsou hojné kapradiny osladič obecný (*Polypodium vulgare*), sleziník červený (*Asplenium trichomanes*) a puchýřník křehký (*Cystopteris fragilis*), zajímavý je výskyt rybízu alpského (*Ribes alpinum*), skalníku černoplodého (*Cotoneaster melanocarpus*) a růže převislé (*Rosa pendula*). V okolí Čepičkova vrchu na jaře poutá pozornost porost sněženky podsněžníku (*Galanthus nivalis*). Z dalších zajímavějších druhů rostlin ještě uvádíme lilii zlatohlavou (*Lilium martagon*), lýkovec jedovatý (*Daphne mezereum*), orchidejovité rostliny vemeník dvoulistý (*Platanthera bifolia*) a okrotici dlouholistou (*Cephalanthera longifolia*). Bohužel i toto krásné údolí je poškozeno nevhodným lesnickým hospodařením preferujícím smrkové monokultury.

Region: Bystřicko Bystřicko

Město: Štěpánov nad Svratkou Prosetín

URL: [http://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/evl/index.php?frame&SHOW\\_ONE=1&ID=13438](http://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/evl/index.php?frame&SHOW_ONE=1&ID=13438);  
[http://www.nature.cz/natura2000-design3/web\\_lokality.php?cast=1805&akce=karta&id=1000119330](http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_lokality.php?cast=1805&akce=karta&id=1000119330)

Zpřístupnění: volně přístupné

Bezbariérový přístup: nedefinováno

GPS: 49°29'43" N, 16°22'24" E

Mapa: <http://maps.google.com/maps?q=49.4833333,16.3666667&z=12>

Obrázky:

